

用法コード一覧（外用）

分類	標準用法 整理番号	標準用法記述	標準用法コード（注１）				備考
生活リズムを基本とする外用用法	2101	１日１回起床時	2*61	0000	9000	0000	
	2102	１日１回朝	2*61	0009	0000	0000	
	2103	１日１回昼	2*61	0090	0000	0000	
	2104	１日１回夕	2*61	0900	0000	0000	
	2105	１日１回就寝時	2*61	1000	0000	0000	注２
	2106	１日２回朝夕	2*62	0909	0000	0000	
	2107	１日２回朝と就寝前	2*62	1009	0000	0000	
	2108	１日２回午前と午後	2*62	0A0A	0000	0000	
	2109	１日３回朝昼夕	2*63	0999	0000	0000	
	2110	１日４回朝昼夕と就寝前	2*64	1999	0000	0000	
１日回数だけを明示した外用用法	2201	１日１回	2*71	0000	0000	0000	
	2202	１日２回	2*72	0000	0000	0000	
	2203	１日３回	2*73	0000	0000	0000	
	2204	１日４回	2*74	0000	0000	0000	
	2205	１日６回	2*76	0000	0000	0000	
	2206	１日３回程度	2*73	A000	0000	0000	
	2207	１日４回程度	2*74	A000	0000	0000	
	2208	１日６回程度	2*76	A000	0000	0000	
	2209	１日１～２回	2*71	2000	0000	0000	
	2210	１日１～数回	2*71	N000	0000	0000	
	2211	１日２～３回	2*72	3000	0000	0000	
	2212	１日３～４回	2*73	4000	0000	0000	
	2213	１日４～５回	2*74	5000	0000	0000	
時間間隔で明示した外用用法（時刻指定型）	2301	２～３時間毎	2*82	3000	0000	0000	
	2302	４～６時間毎	2*84	6000	0000	0000	
	2401	疼痛時	2*50	1100	0000	0000	
	2402	頭痛時	2*50	1200	0000	0000	
	2403	歯痛時	2*50	1300	0000	0000	
	2404	胸痛時	2*50	1400	0000	0000	
	2405	腹痛時	2*50	1500	0000	0000	
	2406	腰痛時	2*50	1600	0000	0000	
	2407	関節痛時	2*50	1700	0000	0000	
	2408	喘鳴時	2*50	2100	0000	0000	
	2409	喘息発作時	2*50	2200	0000	0000	

2410	喉がゴロゴロする時	2*50	2300	0000	0000	
2411	しゃっくり時	2*50	2400	0000	0000	
2412	咳込時	2*50	2500	0000	0000	
2413	血圧上昇時 mHg以上	2*50	3170	0000	0000	注 3
2414	血糖値 mg/dL以上	2*50	3270	0000	0000	注 3
2415	便秘時	2*50	4100	0000	0000	
2416	お腹がゴロゴロする時	2*50	4200	0000	0000	
2417	下痢時	2*50	4300	0000	0000	
2418	排便時	2*50	4400	0000	0000	注 4
2419	嘔吐時	2*50	4500	0000	0000	
2420	口腔乾燥時	2*50	4600	0000	0000	注 4
2421	吐き気時	2*50	4700	0000	0000	
2422	空腹時	2*50	4800	0000	0000	
2423	出血時	2*50	4900	0000	0000	
2424	乏尿時 mL / 時間未満	2*50	5150	0000	0000	注 3
2425	多尿時	2*50	5200	0000	0000	
2426	むくみ時	2*50	5300	0000	0000	
2427	不眠時	2*50	6100	0000	0000	
2428	不安時	2*50	6200	0000	0000	
2429	不穏時	2*50	6300	0000	0000	
2430	いらいら時	2*50	6400	0000	0000	
2431	けいれん時	2*50	6500	0000	0000	
2432	めまい時	2*50	6600	0000	0000	
2433	疲労時	2*50	6700	0000	0000	
2434	発熱時(度以上)	2*50	7170	0000	0000	注 3
2435	悪寒時	2*50	7200	0000	0000	
2436	かゆい時	2*50	8100	0000	0000	
2437	発疹時	2*50	8200	0000	0000	
2438	発作時	2*50	9100	0000	0000	
2439	症状ある時	2*50	9200	0000	0000	
2440	検査前	2*50	A120	0000	0000	必須指示 注 5
2441	検査時	2*50	A220	0000	0000	必須指示 注 5
2442	検査後	2*50	A320	0000	0000	必須指示 注 5
2443	手術前	2*50	A420	0000	0000	必須指示 注 5
なし	手術中	2*50	A520	0000	0000	必須指示 注 5
2444	手術後	2*50	A620	0000	0000	必須指示 注 5
2445	処置前	2*50	A720	0000	0000	必須指示 注 5
2446	処置時	2*50	A820	0000	0000	必須指示 注 5
2447	処置後	2*50	A920	0000	0000	必須指示 注 5
2448	起床時	2*50	B100	0000	0000	

2449	入浴前	2*50	B200	0000	0000	
2450	食事前	2*50	B300	0000	0000	
2451	食事後	2*50	B400	0000	0000	
2452	就寝前	2*50	B500	0000	0000	
2453	外出時	2*50	B600	0000	0000	
2454	哺乳時	2*50	B700	0000	0000	
2455	必要時	2*50	W100	0000	0000	
2456	適宜	2*50	W200	0000	0000	

（注１） 2桁目の*は、用法詳細区分コードで、外用用法の違いによりいずれかのコードを使用する（仕様書表２）。

（注２） 内服用法では「1日1回就寝前」となっており記述が異なる。これは日本病院薬剤師会と日本薬剤師会の「標準用法用語集（第1版）」に合わせたものである。

（注３） 数値による付帯条件を記述するため、「以下」は7桁目を5、「以上」は7桁目を7で記述する。条件数値そのものは単位とともに別に記述するものとし、用法タイミングコードでは表現しない。「以下」「以上」以外の条件を必要とする場合のコードの使い方については仕様書表７を参照のこと。

（注４） 頓用内服用法には存在しないので注意。

（注５） イベント時に必須使用の指示の場合を想定。任意使用の指示の場合には7桁目を2ではなく0とする。詳細は仕様書表７を参照のこと。